

HISTEROSALPINGOGRAFÍA

El estudio debe efectuarse hasta el **11avo día del inicio del ciclo menstrual**. Debe ser realizado una vez que se haya retirado el sangrado menstrual.

DÍAS PREVIOS AL ESTUDIO

- **Abstinencia sexual 72hs** previas al estudio
- Tomar 3 comprimidos de **APASMO**:
 - ✓ Día previo: 2 comprimidos (1 cada 12 horas)
 - ✓ Día del estudio: 1 comprimido 1 hora antes del estudio
- Tomar **CIPROFLOXACINA 500mg** durante 5 días:
 - ✓ Se inicia la toma, el día previo al estudio
 - ✓ 2 comprimidos por día (1 cada 12 horas)

DÍA DEL ESTUDIO

- Traer en frasco estéril la 1er **orina** de la mañana
- 6 horas de **ayuno**
- Tomar el comprimido de **apasmo** indicado en la preparación
- Tomar el antibiótico profiláctico (**ciprofloxacina**) indicado en la preparación
- Concurrir **higienizada**
- Traer estudios previos relacionados
- En lo posible leer y traer firmado el "consentimiento informado"

POSTERIOR AL ESTUDIO

- Podrá tener una pérdida sanguínea (menor que la menstruación) durante 1 o 2 horas. Es normal y corresponde a la salida del contraste.
- Dolor de tipo menstrual: es normal. Puede tomar Ibu-evanol o similares que tome habitualmente para dolores menstruales.
- En caso de tener sangrado abundante debe concurrir a una guardia.